

V Prostějově dne 27. 1. 2025

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

pro Vaší informaci, ve všech Laboratořích klinické hematologie a krevní banky Oddělení laboratorní medicíny AGEL Středomoravské nemocniční a.s., nově vyšetřujeme hladiny rivaroxabanu a apixabanu v režimu RUTINA i STATIM. Výsledky jsou vydávány bez referenčních mezí, tyto jsou k dispozici zde:

Terapeutické koncentrace rivaroxabanu

Indikace	Dávka	Vrcholová koncentrace za 2-4 hodiny po aplikaci	Minimální koncentrace před další dávkou
Prevence HŽT po TEP	10 mg denně	101 (7 - 273)	14 (4 - 51)
Prevence aterotrombotických příhod u AKS	2,5 mg 2x denně	47 (13 - 123)	9,2 (4,4 - 18)
Prevence CMP a EP u nevalvulární FiS	20 mg denně	215 (22 - 535)	32 (6 - 239)
Léčba a prevence recidivy HŽT a EP	20 mg denně	215 (22 - 535)	32 (6 - 239)

Terapeutické koncentrace apixabanu

Indikace	Dávka	Vrcholová koncentrace za 2-4 hodiny po aplikaci	Minimální koncentrace před další dávkou
Prevence po TEP	2,5 mg 2x denně	77 (41 - 146)	51 (23 - 109)
Prevence CMP a EP u nevalvulární FiS	2,5 mg 2x denně	123 (69 - 221)	79 (34 - 162)
Prevence CMP a EP u nevalvulární FiS	5 mg 2x denně	171 (91 - 321)	103 (41 - 230)
Léčba a prevence recidivy HŽT a EP	2,5 mg 2 x denně	67 (30 - 153)	32 (11 - 90)
Léčba a prevence recidivy HŽT a EP	5 mg 2 x denně	132 (59 - 302)	63 (22 - 177)
Léčba a prevence recidivy HŽT a EP	10 mg 2 x denně	251 (111 - 572)	120 (41 - 335)

S pozdravem

MUDr. Michaela Černá
primářka Oddělení laboratorní medicíny